

未成年のこうむる喫煙害をまず一般論としてまとめてみます。

1. たばこに含まれる有害物質

	作用	急性症状	慢性障害
ニコチン	アドレナリン分泌促進、末梢神経収縮、血圧上昇、心拍数増加、脳・皮膚・内臓血流量低下	動悸、息切れ、気分不良、嘔気・嘔吐、冷汗、めまい、失神、食欲減退	虚血性心疾患、くも膜下出血
タール	発がん性		肺がん、喉頭がん、膀胱がん、など
一酸化炭素	ヘモグロビンに結合し酸素運搬能低下、赤血球変形能低下、血管内皮の損傷	動悸、息切れ	運動能力低下、持久力低下、動脈硬化
シアン化物	気道内皮細胞・繊毛の障害	気管支炎	慢性気管支炎、肺気腫
アルデヒド	粘膜刺激作用、発がん性	嘔気・嘔吐、頭痛	肺がん、食道がんなど

2. 喫煙による急性障害

動悸、息切れ、気分不良、悪心、嘔吐、冷汗、めまい、失神、咳嗽、口渇、口臭、食欲減退

呼吸器疾患（上気道・下気道感染症）の増加

3. 常習的喫煙による慢性障害

肺がん、喉頭がん、咽頭がん、口腔がん、食道がん、胃がん、子宮頸部がん、膀胱がん、膵臓がん、など

慢性気管支炎、気管支喘息、肺気腫

虚血性心疾患、くも膜下出血、壊疽、歯肉炎

胃・十二指腸潰瘍、胆石症、肝硬変